

| EPOCA                                                 | INFESTANTI                        | SOSTANZA ATTIVE          | NOTE                                                                                                           |
|-------------------------------------------------------|-----------------------------------|--------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Pre trapianto<br>Pre ricaccio<br>e/o<br>Post raccolta | Graminacee<br>e<br>Dicotiledoni   | Glifosate (1)            |                                                                                                                |
| Pre ricaccio                                          |                                   | Dicamba                  | E' opportuno alternare i prodotti nella fase di pre ricaccio per evitare che si selezionino specifiche malerbe |
| Pre ricaccio                                          |                                   | Pendimetalin             |                                                                                                                |
| Post raccolta                                         | Graminacee e<br>Dicotiledoni      | Pendimetalin + Clomazone |                                                                                                                |
| Pre emergenza                                         | Graminacee e<br>e<br>Dicotiledoni | Metribuzin               |                                                                                                                |
| Post raccolta                                         | Graminacee                        | Propaquizafop            |                                                                                                                |
| Post emergenza<br>Post trapianto<br>Post raccolta     | Graminacee<br>e<br>Dicotiledoni   | Metobromuron<br>Piridate |                                                                                                                |

**(1) Limite aziendale di impiego del Glifosate su colture non arboree**

Ogni azienda per singolo anno ( 1 gen. 31 dic.) può disporre di un quantitativo massimo di glifosate (riferimento ai formulati 360 g/L) pari a 2 L per ogni ettaro di colture non arboree sulle quali è consentito l'uso del prodotto.

Il quantitativo totale di glifosate ottenuto dal calcolo  $2 \text{ L/ha} \times n$ , ha ammissibili è quello massimo disponibile per l'utilizzo su tutte le specie non arboree coltivate nel rispetto della etichetta del formulato.

Nel caso di due colture / anno sulla stessa superficie la quantità di glifosate si conteggia per tutte e due le colture.

Si raccomanda di non utilizzare il prodotto in modo generalizzato a dosi troppo basse ma piuttosto di adoperarsi per evitarne l'utilizzo ove possibile e impiegare dosaggi corretti (vedi etichetta) dove non ci sono valide alternative.

| EPOCA          | INFESTANTI                | SOSTANZE ATTIVE                    | NOTE                                                           |
|----------------|---------------------------|------------------------------------|----------------------------------------------------------------|
| Pre semina     | Dicotiledoni e Graminacee | Glifosate (1)<br>Acido pelargonico |                                                                |
| Pre emergenza  | Graminacee e Dicotiledoni | Acido pelargonico                  |                                                                |
|                | Dicotiledoni              | Metamitron                         |                                                                |
| Post emergenza | Dicotiledoni              | Fenmedifam<br>Metamitron           |                                                                |
|                | Graminacee                | Cicloxdim<br>Quizalofop-p-etile    |                                                                |
|                | Graminacee e Dicotiledoni | Acido pelargonico (2)              | (2) Prodotto non selettivo. Utilizzare attrezzature schermate. |

**(1) Limite aziendale di impiego del Glifosate su colture non arboree**

Ogni azienda per singolo anno ( 1 gen. 31 dic.) può disporre di un quantitativo massimo di glifosate (riferimento ai formulati 360 g/L) pari a 2 L per ogni ettaro di colture non arboree sulle quali è consentito l'uso del prodotto.

Il quantitativo totale di glifosate ottenuto dal calcolo  $2 \text{ L/ha} \times n$ . ha ammissibili è quello massimo disponibile per l'utilizzo su tutte le specie non arboree coltivate nel rispetto della etichetta del formulato.

Nel caso di due colture / anno sulla stessa superficie la quantità di glifosate si conteggia per tutte e due le colture.

Si raccomanda di non utilizzare il prodotto in modo generalizzato a dosi troppo basse ma piuttosto di adoperarsi per evitarne l'utilizzo ove possibile e impiegare dosaggi corretti (vedi etichetta) dove non ci sono valide alternative.

## Controllo Integrato delle infestanti di: CARCIOFO

| EPOCA                                           | INFESTANTI                      | SOSTANZA ATTIVE            | NOTE                                                                                                                               |
|-------------------------------------------------|---------------------------------|----------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Pre<br>Trapianto<br>Pre ricaccio                | Dicotiledoni<br>e<br>Graminacee | Glifosate (1)              |                                                                                                                                    |
| Pre trapianto<br>Pre ricaccio                   | Dicotiledoni                    | Aclonifen                  |                                                                                                                                    |
| Post-trapianto<br>Pre-ricaccio<br>Post-ricaccio | Dicotiledoni e graminacee       | Oxifluorfen (1) (2)        | <b>(1) Ammesso solo tra l'ultima decade di settembre e la prima decade di maggio. Impiegabile solo lungo le file</b>               |
|                                                 |                                 | Pendimethalin              | <b>(2) Se utilizzato in post trapianto proteggere la coltura con opportuna schermatura; utilizzabile su chiazze di acetosella.</b> |
|                                                 |                                 | Metazaclor                 |                                                                                                                                    |
|                                                 |                                 | Aclonifen                  |                                                                                                                                    |
| Post - trapianto<br>e<br>Post - ricaccio        | Dicotiledoni                    | Piridate                   |                                                                                                                                    |
|                                                 | Graminacee                      | Quizalofop etile isomero D |                                                                                                                                    |
|                                                 |                                 | Quizalofop-p-etile         |                                                                                                                                    |
|                                                 |                                 | Clethodim                  |                                                                                                                                    |

### **(1) Limite aziendale di impiego del Glifosate su colture non arboree**

Ogni azienda per singolo anno ( 1 gen. 31 dic.) può disporre di un quantitativo massimo di glifosate (riferimento ai formulati 360 g/L) pari a 2 L per ogni ettaro di colture non arboree sulle quali è consentito l'uso del prodotto.

Il quantitativo totale di glifosate ottenuto dal calcolo  $2 \text{ L/ha} \times n$ . ha ammissibili è quello massimo disponibile per l'utilizzo su tutte le specie non arboree coltivate nel rispetto della etichetta del formulato.

Nel caso di due colture / anno sulla stessa superficie la quantità di glifosate si conteggia per tutte e due le colture.

Si raccomanda di non utilizzare il prodotto in modo generalizzato a dosi troppo basse ma piuttosto di adoperarsi per evitarne l'utilizzo ove possibile e impiegare dosaggi corretti (vedi etichetta) dove non ci sono valide alternative.

## Controllo Integrato delle infestanti di: CARDO

| EPOCA                         | INFESTANTI                | SOSTANZA ATTIVA                    | NOTE |
|-------------------------------|---------------------------|------------------------------------|------|
| Pre-trapianto                 | Graminacee e Dicotiledoni | Glifosate (1)<br>Acido pelargonico |      |
| Pre-trapianto<br>Pre-ricaccio | Graminacee e Dicotiledoni | Pendimetalin                       |      |

### (1) Limite aziendale di impiego del Glifosate su colture non arboree

Ogni azienda per singolo anno ( 1 gen. 31 dic.) può disporre di un quantitativo massimo di glifosate (riferimento ai formulati 360 g/L) pari a 2 L per ogni ettaro di colture non arboree sulle quali è consentito l'uso del prodotto.

Il quantitativo totale di glifosate ottenuto dal calcolo  $2 \text{ L/ha} \times n$ , ha ammissibili è quello massimo disponibile per l'utilizzo su tutte le specie non arboree coltivate nel rispetto della etichetta del formulato.

Nel caso di due colture / anno sulla stessa superficie la quantità di glifosate si conteggia per tutte e due le colture.

Si raccomanda di non utilizzare il prodotto in modo generalizzato a dosi troppo basse ma piuttosto di adoperarsi per evitarne l'utilizzo ove possibile e impiegare dosaggi corretti (vedi etichetta) dove non ci sono valide alternative.

## Controllo Integrato delle infestanti di: CAROTA

| EPOCA          | INFESTANTI                              | SOSTANZA ATTIVE                | NOTE                                             |
|----------------|-----------------------------------------|--------------------------------|--------------------------------------------------|
| Pre semina     | Graminacee<br>e<br>Dicotiledoni         | Acido Pelargonico<br>Glifosate |                                                  |
| Pre emergenza  | Graminacee annuali<br>e<br>Dicotiledoni | Aclonifen                      | <b>Solo colture per la produzione di sementi</b> |
|                |                                         | Clomazone                      |                                                  |
|                |                                         | Metobromuron                   |                                                  |
|                |                                         | Pendimetalin                   |                                                  |
| Post emergenza | Dicotiledoni                            | Metribuzin                     |                                                  |
|                | annuali                                 | Pendimetalin                   |                                                  |
|                |                                         | Clethodim                      |                                                  |
|                | Graminacee                              | Propaquizafop                  |                                                  |
|                |                                         | Quizalofop-etile isomero D     |                                                  |
|                |                                         | Quizalofop-p-etile             |                                                  |
|                | Ciclossidim                             |                                |                                                  |

### **(1) Limite aziendale di impiego del Glifosate su colture non arboree**

Ogni azienda per singolo anno ( 1 gen. 31 dic.) può disporre di un quantitativo massimo di glifosate (riferimento ai formulati 360 g/L) pari a 2 L per ogni ettaro di colture non arboree sulle quali è consentito l'uso del prodotto.

Il quantitativo totale di glifosate ottenuto dal calcolo  $2 \text{ L/ha} \times n$ . ha ammissibili è quello massimo disponibile per l'utilizzo su tutte le specie non arboree coltivate nel rispetto della etichetta del formulato.

Nel caso di due colture / anno sulla stessa superficie la quantità di glifosate si conteggia per tutte e due le colture.

Si raccomanda di non utilizzare il prodotto in modo generalizzato a dosi troppo basse ma piuttosto di adoperarsi per evitarne l'utilizzo ove possibile e impiegare dosaggi corretti (vedi etichetta) dove non ci sono valide alternative.

## Controllo Integrato delle infestanti di: FINOCCHIO

| EPOCA                            | INFESTANTI                   | SOSTANZA ATTIVE   | NOTE                                                     |
|----------------------------------|------------------------------|-------------------|----------------------------------------------------------|
| Pre semina<br>Pre trapianto      | Dicotiledoni e<br>Graminacee | Acido Pelargonico |                                                          |
|                                  |                              | Glifosate (1)     |                                                          |
| Pre trapianto e<br>pre emergenza | Dicotiledoni                 | Metobromuron      | Solo su colture per la produzione di sementi             |
|                                  | Dicotiledoni e<br>Graminacee | Pendimetalin (2)  | (2) Ammesso 1 solo trattamento, a prescindere dall'epoca |
|                                  |                              | Clomazone         |                                                          |
| Dicotiledoni                     | Aclonifen                    |                   |                                                          |
| Post emergenza                   | Dicotiledoni                 | Metribuzin        |                                                          |
| Post trapianto                   | Dicotiledoni e<br>Graminacee | Pendimetalin (2)  | (2) Ammesso 1 solo trattamento, a prescindere dall'epoca |
|                                  | Graminacee                   | propaquizafop     |                                                          |

### (1) Limite aziendale di impiego del Glifosate su colture non arboree

Ogni azienda per singolo anno ( 1 gen. 31 dic.) può disporre di un quantitativo massimo di glifosate (riferimento ai formulati 360 g/L) pari a 2 L per ogni ettaro di colture non arboree sulle quali è consentito l'uso del prodotto.

Il quantitativo totale di glifosate ottenuto dal calcolo 2 L/ha x n. ha ammissibili è quello massimo disponibile per l'utilizzo su tutte le specie non arboree coltivate nel rispetto della etichetta del formulato.

Nel caso di due colture / anno sulla stessa superficie la quantità di glifosate si conteggia per tutte e due le colture.

Si raccomanda di non utilizzare il prodotto in modo generalizzato a dosi troppo basse ma piuttosto di adoperarsi per evitarne l'utilizzo ove possibile e impiegare dosaggi corretti (vedi etichetta) dove non ci sono valide alternative.

**Controllo Integrato delle infestanti di: MAIS DOLCE**

| <b>EPOCA</b>         | <b>INFESTANTI</b> | <b>SOSTANZA ATTIVE</b>                       | <b>NOTE</b> |
|----------------------|-------------------|----------------------------------------------|-------------|
| Pre semina           |                   | Glifosate (1)                                |             |
| Post emergenza       |                   | (Tembotrione + Isoxadifen-ethyl)<br>Piridate |             |
| Pre e post emergenza |                   | Mesotrione                                   |             |

**Non sono ammessi interventi con prodotti chimici**



## Controllo Integrato delle infestanti di: RAVANELLO

| EPOCA          | INFESTANTI                      | SOSTANZA ATTIVE                                         | NOTE                                                                                              |
|----------------|---------------------------------|---------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Pre<br>Semina  | Dicotiledoni<br>e<br>Graminacee | Glifosate (1)                                           |                                                                                                   |
|                |                                 |                                                         |                                                                                                   |
| Post emergenza | Graminacee                      | Fluazifop-p-butile<br>Quizalofop-p-etile<br>Ciclossidim | Per migliorare l'azione aggiungere gli attivanti consigliati in etichetta<br>30 giorni di carenza |

**(1) Limite aziendale di impiego del Glifosate su colture non arboree**

Ogni azienda per singolo anno ( 1 gen. 31 dic.) può disporre di un quantitativo massimo di glifosate (riferimento ai formulati 360 g/L) pari a 2 L per ogni ettaro di colture non arboree sulle quali è consentito l'uso del prodotto.

Il quantitativo totale di glifosate ottenuto dal calcolo 2 L/ha x n. ha ammissibili è quello massimo disponibile per l'utilizzo su tutte le specie non arboree coltivate nel rispetto della etichetta del formulato.

Nel caso di due colture / anno sulla stessa superficie la quantità di glifosate si conteggia per tutte e due le colture.

Si raccomanda di non utilizzare il prodotto in modo generalizzato a dosi troppo basse ma piuttosto di adoperarsi per evitarne l'utilizzo ove possibile e impiegare dosaggi corretti (vedi etichetta) dove non ci sono valide alternative.

## Controllo Integrato delle infestanti di: SEDANO

| EPOCA                         | INFESTANTI                   | SOSTANZE ATTIVE                        | NOTE |
|-------------------------------|------------------------------|----------------------------------------|------|
| Pre semina<br>Pre trapianto   | Dicotiledoni e<br>Graminacee | Glifosate (1)<br><br>Acido pelargonico |      |
| Pre ricaccio<br>Pre trapianto | Graminacee<br>Dicotiledoni e | Pendimetalin                           |      |

### **(1) Limite aziendale di impiego del Glifosate su colture non arboree**

Ogni azienda per singolo anno ( 1 gen. 31 dic.) può disporre di un quantitativo massimo di glifosate (riferimento ai formulati 360 g/L) pari a 2 L per ogni ettaro di colture non arboree sulle quali è consentito l'uso del prodotto.

Il quantitativo totale di glifosate ottenuto dal calcolo  $2 \text{ L/ha} \times n$ . ha ammissibili è quello massimo disponibile per l'utilizzo su tutte le specie non arboree coltivate nel rispetto della etichetta del formulato.

Nel caso di due colture / anno sulla stessa superficie la quantità di glifosate si conteggia per tutte e due le colture.

Si raccomanda di non utilizzare il prodotto in modo generalizzato a dosi troppo basse ma piuttosto di adoperarsi per evitarne l'utilizzo ove possibile e impiegare dosaggi corretti (vedi etichetta) dove non ci sono valide alternative.